

EU513-C / CCL LABEL UK

 CORTEVA™ agriscience			
Package MID :	A60008811 2205		
Trade Name :	EXALT 25 SC		
Country :	CROATIA		
Nbre pages (19 p. max.) :	7 pages		
Size :	275 X 127MM		
Artwork Type :	BOOKLET LABEL		
Specification :	EU513-C		
Printer :	EMEA - CCL UK		
Packing Location :	EMEA - CERNAY (F52)		
Ticket No :	N/A		
Date :	05-MAY-2022		
Proof Cycle No :	1		
COLOUR REFERENCES Number of Colours used : 4			
Cyan	Magenta	Jaune	Noir
Last updated by : PUBLI H			

PAGE 1



	CORTEVA™ agriscience
Package MID :	A60008811 2205
Trade Name :	EXALT 25 SC
Country :	CROATIA
Nbre pages (19 p. max.) :	7 pages
Size :	245 X 127MM
Artwork Type :	BOOKLET LABEL
Specification :	EU513-C
Printer :	EMEA - CCL UK
Packing Location :	EMEA - CERNAY (F52)
Ticket No :	N/A
Date :	05-MAY-2022
Proof Cycle No :	1
COLOUR REFERENCES	
Number of Colours used :	1
Noir	
Last updated by :	PUBLI H

PAGE 2

245 mm 245 mm
232 mm 232 mm

5 mm

127 mm

UPUTA ZA UPORABU

EXALT™ 25 SC

SADRŽI: spinetoram, 25 g/L (2,47 % w/w)

XDE-175-J (osnovni čimbenik) 2-(6-deoksi-3-O-etyl-2,4-di-O-metil-α-L-mannopiranosioksi)-13-[(2R,3S,6R)-5-(dimetilamino)tetrahidro-6-metilpiran-2-iloksi]-9-etyl2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16bheksadekahidro-14-metil-1H-as-indacen[3,2-d]oksaciklododecin-7,15-dion XDE-175-L (sekundarni čimbenik)

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoksi-3-O-etyl-2,4-di-O-metil-α-L-manopiranosioksi)-13-[(2R,3S,6R)-5-(dimetilamino)tetrahidro-6-metilpiran-2-iloksi]-9-etyl2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetraedekahidro-4,14-dimetil-1H-as-indacen[3,2-d]oksaciklododecin-7,15-dion CAS br.: 935545-74-7

EXALT™ 25 SC je kontaktno željanči insekticid koji se primjenjuje na:

1) rajčici (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), paprći (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), ljutoj paprći (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), patlidžanu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) i pepinu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), za suzbijanje kalifornijskog tripsa (*Frankliniella occidentalis*) primjenom kod pojave odraslih oblika, za suzbijanje sovice (*Spodoptera littoralis*) i žute kukuruzne sovice (*Helicoverpa armigera*) primjenom kod pojave prvih ličinki te južnoameričkog moljca rajčice (*Tuta absoluta*) primjenom kod izlaska ličinki iz jaja. Sredstvo se primjenjuje u količini 2 L/ha od stadija razvijenog četvrtog lista do pune zrelosti (BBCH 14-89) i uz utrošak vode 400-800 L/ha.

2) tikvici (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), krastavcu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), bundje (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), dinji (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) i lubenici (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) za suzbijanje kalifornijskog tripsa (*Frankliniella occidentalis*) primjenom kod pojave prvih odraslih oblika i sovice (*Spodoptera littoralis*) i žute kukuruzne sovice (*Helicoverpa armigera*) primjenom kod pojave prvih ličinki. Sredstvo se primjenjuje u količini 2,4 L/ha od stadija razvijenog četvrtog lista do pune zrelosti (BBCH 14-89) uz utrošak vode 800-1000 L/ha.

3) na otvorenom i u zaštićenom prostoru: rikoli, matovilcu, tuštu te svježem začinskom bilju (vlasac, peršin, kadulja, ružmarin, timijan, bosiljak, lovor, estragon, kopriva, origano i stevia), za suzbijanje kalifornijskog tripsa (*Frankliniella occidentalis*) primjenom kod pojave odraslih oblika i sovice (*Spodoptera littoralis*) i žute kukuruzne sovice (*Helicoverpa armigera*) primjenom kod pojave prvih ličinki. Sredstvo se primjenjuje u količini 2 L/ha od stadija razvijenog prvog lista do formiranja glavica (BBCH 11-49) i uz utrošak vode 300-1000 L/ha;

4) na otvorenom: zelenoj salati i blitvi za suzbijanje kalifornijskog tripsa (*Frankliniella occidentalis*) primjenom kod pojave odraslih oblika i sovice (*Spodoptera littoralis*) i žute kukuruzne sovice (*Helicoverpa armigera*) primjenom kod pojave prvih odraslih oblika i sovice (Spodoptera littoralis) i žute kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera).

primjenom kod pojave prvih ličinki. Sredstvo se primjenjuje u količini 2 L/ha od stadija razvijenog prvog lista do formiranja glavica (BBCH 11-49) i uz utrošak vode 300-1000 L/ha

3. Potrebnu količinu sredstva EXALT™ 25 SC dodati u spremnik stroja za primjenu pesticida. Treba pripremiti samo toliko škopiva, koliko je stvarno potrebno.

5) **na otvorenom: cvjetati, brokuli, kupusu, kelju, kelju pupčaru, korabi, kineskom kupusu, crnom kupusu i listovima postrne repe**, za suzbijanje lisne sovice (*Mamestra brassicae*), kupusnog bijelca (*Pieris brassicae*), sovice (*Spodoptera littoralis*), kupusnog moljca (*Plutella xylostella*) i žute kukuruzne sovice (*Helicoverpa armigera*) u količini 2 L/ha od stadija vidljivih prvih listova do formiranja glavica (BBCH 10-49) i uz utrošak vode 400-800 L/ha. Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih ličinki štetnika;

6) **jagodi (na otvorenom i u zaštićenom prostoru)** za suzbijanje kalifornijskog tripsa (*Frankliniella occidentalis*) primjenom kod pojave odraslih oblika, sovice (*Spodoptera littoralis*) i žute kukuruzne sovice (*Helicoverpa armigera*) primjenom kod pojave prvih ličinki; octene mušice ploda (*Drosophila suzukii*). Sredstvo se primjenjuje u količini 2 L/ha od stadija vidljivih prvih listova do pune zrelosti (BBCH 11-89) i uz utrošak vode 400-800 L/ha;

7) **na otvorenom i u zaštićenom prostoru: kupini, malini, borovnici, azaroli, ribizu, ogrozdu, bobicama bazge i šipak**, za suzbijanje octene mušice ploda (*Drosophila suzukii*) u količini 2,4 L/ha od stadija vidljivih prvih listova do pune zrelosti (BBCH 11-89) i uz utrošak vode 400-800 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u trenutku pojave štetnika;

8) **na otvorenom i u zaštićenom prostoru: ukrasnom bilju (lukovice, cvjetne kulture i zelene biljke; krizantemu, karafil, gerber, ruža), rasadnici ukrasnog bilja, voćaka, vinove loze, šumskog drveća, rajčici (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), paprći (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), patlidžanu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) i pepinu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), za suzbijanje kalifornijskog tripsa (*Frankliniella occidentalis*) primjenom kod pojave odraslih oblika, za suzbijanje sovice (*Spodoptera littoralis*) i žute kukuruzne sovice (*Helicoverpa armigera*) primjenom kod pojave prvih ličinki te južnoameričkog moljca rajčice (*Tuta absoluta*) primjenom kod izlaska ličinki iz jaja. Sredstvo se primjenjuje u količini 2,4 L/ha od stadija razvijenog četvrtog lista do pune zrelosti (BBCH 14-89) i uz utrošak vode 400-800 L/ha;**

9) **ukrasnom grmlju (na otvorenom)**, za suzbijanje kalifornijskog tripsa (*Frankliniella occidentalis*) i duhanovog tripsa (*Thrips tabaci*) primjenom kod pojave odraslih oblika u količini 2 L/ha i uz utrošak vode 400-800 L/ha.

Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1

Način primjene: Sredstvo se primjenjuje traktorskim prskalicama, dok je primjena lednjim prskalicama dozvoljena samo na visokom uzgoju rajčice te visokim kulturama (kupina, malina, borovnica, azarola, ribiz, ogroz, bazga, šipak, ukrasno i šumsko drveće i grmlje te u rasadnici voćaka i vinove loze).

Priprema sredstva za primjenu:

- Provjeriti da li je stroj za primjenu čist i ispravan. Ako nije čist, sve dijelove stroja za primjenu dobro oprati. Podesiti ga tako da protok bude jednoličan.
- Spremnik stroja za primjenu napuniti polovicom potrebe količine vode. Uključiti miješalicu.

Non-printed area on page 2 ONLY (on the back of «Label A-code + Barcode area»)

Non-printed area on page 2 ONLY (on the back of 2D code area printed on the front page)

Mogući utjecaj na učinkovitost: Ako unutar jednog sata nakon primjene sredstva EXALT™ 25 SC padnu oborine moguća je smanjena učinkovitost.

Podaci o načinu/mehanizmu djelovanja sredstva: Sredstvo EXALT™ 25 SC sadrži djejalnu tvar spinetoram iz skupine spinosina, alosteričkih aktivatora nikotinskog acetilkolininskog receptora (nAChR). Spinosini izazivaju hiperaktivaciju živčanog sustava štetnika. Spinetoram je željanči insekticid s kontaktnim djelovanjem.

Mjere zaštite okoliša: Kod primjene sredstva EXALT™ 25 SC moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo EXALT™ 25 SC ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i nećelijanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mijereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi:


Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti: Sredstvo EXALT™ 25 SC primjeniti u propisanim količinama. Kod ponovnih primjena sredstva EXALT™ 25 SC ili sredstava iz iste skupine aktivnih tvari, može doći do smanjenja djelotvornosti. Zbog moguće pojave rezistentnosti štetnika na aktivnu tvar spinetoram preporučuje

PAGE 3

EXALT 25 SC 1L BKL HRV A60008811 2205.indd 2

05/05/2022 10:04

5



THIS PAGE HAS NO LINK INTENT

CORTEVA™ agricience
Package MID : A60008811 2205
Trade Name : EXALT 25 SC
Country : CROATIA
Nbre pages (19 p. max.) : 7 pages
Size : 245 X 127MM
Artwork Type : BOOKLET LABEL
Specification : EU513-C
Printer : EMEA - CCL UK
Packing Location : EMEA - CERNAY (F52)
Ticket No : N/A
Date : 05-MAY-2022
Proof Cycle No : 1
COLOUR REFERENCES
Number of Colours used : 4
Cyan Magenta Jaune Noir
Last updated by : PUBLI H

PAGE 6

