

# Quelex™

Arylex™ active

NOVO!

HERBICID

# Moja farma, naša budúcnosť.




# Quelex™


Arylex™ active


HERBICID

Novo rješenje za suzbijanje širokolisnih korova pa čak i najotpornih vrsta poput *Galium aparine* i *Papaver rhoeas*



 **Aktivne tvari:**  
halauksifen-metil (Arylex™ active) - 104,2 g/kg  
florasulam - 100 g/kg

 **Formulacija:**  
vododispersirajuće granule (WG)

 samo za profesionalne korisnike

### Koje su praktične prednosti?

- Nova kemijska skupina
- Širok spektar djelovanja
- Dvostruki način djelovanja, snažna kontrola različitih korova
- Vrhunska kontrola nad *Galium aparine*, *Fumaria sp.* i *Papaver rhoeas*
- Dug period primjene
- Učinkovit u raznim klimatskim uvjetima
- Omogućuje rotaciju s bilo kojim usjevom
- Kompatibilan je za miješanje
- Siguran je za vaše usjeve i nudi održiv

način očuvanja zdravlja vaših polja. Zadržite fleksibilnost i kontrolu plodoredom i jednostavnom primjenom u proljeće.



Kultura	Korov	Doza	Vrijeme primjene
ozima pšenica (meka i tvrda), ozimi ječam, ozima raž i ozima pšenoraž	bročika ( <i>Galium aparine</i> ), dimnjača ( <i>Fumaria officinalis</i> ), srednja mišjakinja ( <i>Stellaria media</i> ), mak turčinak ( <i>Papaver rhoeas</i> ), kamilica ( <i>Matricaria sp.</i> )	50 g/ha	primijeniti u proljeće od početka busanja do stadija kada je rukavac lista zastavice nabubren (BBCH 21-45);
ozima zob	mrtva kopriva ( <i>Lamium purpureum</i> ), perzijska čestoslavica ( <i>Veronica persica</i> ), rusomača ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ), samonikla uljana repica ( <i>Brassica napus</i> ) i dr.	30 g/ha	primijeniti u proljeće od početka busanja do početka vlatanja (BBCH 21-30);
jara pšenica (meka i tvrda), jari ječam i jara raž		50 g/ha	primijeniti od razvijenog trećeg lista do stadija kada je rukavac lista zastavice nabubren (BBCH 13-45).



### Koje savjete slijediti prilikom primjene?

- Quelex™ se miješa s fungicidima, herbicidima i insekticidima.
- Učinkovita primjena pri

temperaturi 8 - 25 °C

- omogućava primjenu tijekom cijele faze nicanja žitarica, no preporučamo tretiranje korova u razvojnem stadiju 2-8

listova

- vrlo brzo stavlja korov pod kontrolu; prvi simptomi vidljivi su već nakon nekoliko dana