

Package MID : 97077742 2010
Trade Name : STARANE FORTE
Country : CROATIA
Size : 245MM X 127MM
Artwork Type : 1L BOOKLET LABEL
Specification : EU 513 PAGO
Standardisation Level : 8
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : N/A

Ticket No : N/A
Date : 28-OCT-20
Proof Cycle No : 1
Last Updated By : PUBLI H

COLOUR REFERENCES
Number of Colours used: 4



PAGE 1

EU513 Leaflet Label Front page cover

245mm

127mm

CORTEVA
agriscience

Starane™
FORTE

HERBICID

Koncentrat za emulziju (EC)
SADRŽI:
fluroksipir (fluroksipir-meptil) (4-amino-3,5-diklor-6- fluor-2-piridiloksiocena kiselina), 333 g/L (31,5 % w/w), što odgovara fluroksipir-meptili 480 g/L (45,5 % w/w)
CAS br.: 69377-81-7 (fluroksipir)
CAS br.: 81406-37-3 (fluroksipir-meptil)
Ostale tvari: smjesa N,N-dimetildekan-1-amida i N,N-dimetiloktanamida <40 %
STARANE™ FORTE je sistemični herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u ratarstvu, povrčarstvu, aromatičnom bilju te usjevima za proizvodnju sjemena.
Mjere prve pomoći: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti iz kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračeni prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu na etiketi. Nema specifičnog antidota (protuotrova). Liječenje je simptomatsko.

Upozorenje
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H335 Može nadražiti dišni sustav.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P261 Izbjegavati udisanje pare i aerosola.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo, zaštitu za oči i zaštitu za lice.
P302+P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode.
P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.
Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
P501 Odložiti sadržaj i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.
EUH401- Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake obavijesti:
SP 1: Sprječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.
SPa 1: Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo iz skupine sintetskih auksina više od jedanput godišnje na istoj površini.

SPe 2: Zbog zaštite podzemnih voda ne upotrebljavati na alkalnom tlu (pH > 7).
SPe 3: Zbog zaštite neclijanog bilja treba poštivati zone sigurnosti od 5 metara do nepoljoprivredne površine.
SPo: Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica kod pripreme škropiva, rukovanja nerazrijeđenim sredstvom, kod primjene i rukovanja razrijeđenim sredstvom i škropivom.
SPo: Ulazak na tretiranu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva.

Prije uporabe sredstva obavezno pročitati uputu za uporabu.
Samo za profesionalne korisnike.
Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.
Primjena iz zraka nije dopuštena.
Dopuštena mjesta prodaje: Specijalizirane prodavaonice.
Skladištenje i čuvanje: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, u posebnoj prostoriji pod ključem zaštićen od sunčevih zraka i vlage, na prozračenom i suhom mjestu, na sobnoj temperaturi, odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Čuvati odvojeno od izvora paljenja – zabranjeno pušenje. Ne smije se prelijevati u drugu ambalažu, niti u posude iz kojih se jede ili pije ili u kojima se drže namirnice. Zaštititi sredstvo od mraza. Datum proizvodnje i serijski broj otisnuti na ambalaži.
Rok uporabe: 2 godine
Registracijski broj sredstva: UP/II-320-20/17-03/362
Vlasnik rješenja o registraciji: Corteva Agriscience Croatia d.o.o., Ulica Florijana Andrašeca 18 A, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributer: CHROMOS AGRO d.d., Radnička cesta 173 n, Zagreb
™ ® Zaštitni znakovi tvrtke Corteva Agriscience i njenih povezanih tvrtki.

SADRŽAJ: 1 L

Artwork Free area for in-house print of 2D data matrix code

0970777422010



Package MID : 97077742 2010
Trade Name : STARANE FORTE
Country : CROATIA
Size : 245MM X 127MM
Artwork Type : 1L BOOKLET LABEL
Specification : EU 513 PAGO
Standardisation Level : 8
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : N/A

Ticket No : N/A
Date : 28-OCT-20
Proof Cycle No : 1
Last Updated By : PUBLI H

COLOUR REFERENCES
Number of Colours used: 1

Black

EU513 Leaflet Label Inside pages

PAGE 2

245mm

127mm

UPUTA ZA UPORABU

STARANE™ FORTE

Herbicide

Koncentrat za emulziju (EC)

SADRŽI:

fluokspir (fluokspir-meptil) (4-amino-3,5-diklor-6- fluor-2-piridiloksiocetena kiselina), **333 g/L** (31,5 % w/w), što odgovara fluokspir-meptil **480 g/L** (45,5 % w/w)
CAS br.: 69377-81-7 (fluokspir)
CAS br.: 81406-37-3 (fluoksiopir-meptil)

Ostale tvari: smjesa N,N-dimetildekan-1-amida i N,N-dimetiloktanamida <40 %

STARANE™ FORTE je selektivno sistemsko herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u:

- ozimoj pšenici, ozimoj tvrdoj pšenici, ozimom ječmu, ozimoj raži, ozimoj pšenoraži, ozimoj zobi, jaroj pšenici, jaroj tvrdoj pšenici, jaroj ječmu, jaroj raži, jaroj zobi**, u količini 0,6 L/ha (60 mL/1000 m²) nakon nicanja (post-em) od stadija 2 prava lista do stadija nadutog rukavca zastavice (BBCH 12-45);
- kukuruzu za zrno i kukuruza za silažu**, u količini 0,6 L/ha (60 mL/1000 m²) nakon nicanja (post-em) od stadija prvih listova kroz koleoptilu do stadija razvoja 5 listova kukuruza (BBCH 10-15);
- lavandi i lavandinu**, u količini 0,45 L/ha (45 mL/1000 m²) u stadiju mirovanja od siječnja do ožujka i to samo u trajnim nasadima nakon prve žetve.

Ograničenje: Ne smiju se koristiti za prehranu ljudi ili ishranu životinja;

- usjevima za proizvodnju sjemena: luka vlasca, luka kozjaka, poriluka, rotkvice i krizanteme**, u količini 0,3 L/ha (30 mL/1000 m²) prije presađivanja biljaka od ožujka do srpnja ili od rujna do studenog, od stadija razvoja 2 lista do prije pojave cvjetne stapke (BBCH 12-29).

Ograničenje: Ne smiju se koristiti za prehranu ljudi ili ishranu životinja;

- kultiviranom maku**, u količini 0,15 L/ha (15 mL/1000 m²) nakon nicanja (post-em) u razvojnim stadijima od šest do devet listova (BBCH 16-19).

**Non-printed area on page 2 ONLY
(on the back of 2D code area printed
on the front page)**

Ograničenje: Ne smije se koristiti za prehranu ljudi ili ishranu životinja;

- luku (iz lučica), češnjaku (iz lučica) i luku kozjaku (iz lučica)**, primjenom:

a) jednokratno u količini 0,24 L/ha (24 mL/1000 m²) nakon nicanja kulture (post-em) od travnja do lipnja, u stadijima razvoja 2-4 lista (BBCH 12-14)

ili

b) dvokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji u količini 0,12 L/ha + 0,12 L/ha. Prvi puta primijeniti nakon nicanja kulture (post-em) u stadiju razvoja 2 prava lista (BBCH 12) te drugi puta nakon 10-15 dana, a najkasnije do stadija razvoja 4 prava lista (BBCH 14) kulture.

Utrošak vode: 150-400 L/ha

Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1

Način primjene: prskanje traktorskim ili leđnim prskalicama

Priprema sredstva za primjenu:

- Provjeriti je li stroj za primjenu pesticida čist i ispravan, ako nije čist sve dijelove stroja za primjenu dobro oprati. Podesiti ga tako da protok bude jednoličan.
- Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti.
- Potrebnu količinu sredstva STARANE™ FORTE uliti u spremnik stroja za primjenu pesticida koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode u kojem je uključena miješalica.
- Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.
- Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

Karenca: 90 dana za luk iz lučica, češnjak iz lučica i luk kozjak iz lučica. Osigurana je vremenom primjene u ozimoj pšenici, ozimoj tvrdoj pšenici, ozimom ječmu, ozimoj raži, ozimoj pšenoraži, ozimoj zobi, jaroj pšenici, jaroj tvrdoj pšenici, jaroj ječmu, jaroj raži, jaroj zobi i kukuruza za zrno i silažu. Nije primjenjiva u lavandi, lavandinu, kultiviranom maku i usjevima za proizvodnju sjemena luka vlasca, luka kozjaka, poriluka, rotkvice i krizantema.

Radna zabrana: Ispaša domaćih životinja zabranjena je 48 sati nakon tretiranja.

Plodored: 10 mjeseci nakon primjene sredstva na istoj se površini mogu saditi korjenaste i gomoljaste kulture; nakon 4 mjeseca mogu se sijati djetelina, grašak i grah; nakon 2 mjeseca mogu se sijati/saditi lucerna, suncokret, soja i rajčica. Tlo na kojem se primjenjivalo sredstvo trebalo bi preorati prije daljnje primjene.

Fitotoksičnost: Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način ono nije fitotoksično za kulture u kojima je odobrena primjena. Prilikom primjene sredstva STARANE™ FORTE spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Ograničenja: Sredstvo STARANE™ FORTE smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini (jednokratno ili dvokratno (split aplikacija), sukladno odobrenoj primjeni). Lavanda, lavandin, kultivirani mak i usjevi za proizvodnju sjemena (luk vlasac, luk kozjak, porluk, rotkvica i krizantema) tretirani sredstvom STARANE™ FORTE ne smiju se koristiti za prehranu ljudi ili ishranu životinja.



Package MID : 97077742 2010
Trade Name : STARANE FORTE
Country : CROATIA
Size : 245MM X 127MM
Artwork Type : 1L BOOKLET LABEL
Specification : EU 513 PAGO
Standardisation Level : 8
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : N/A

Ticket No : N/A
Date : 28-OCT-20
Proof Cycle No : 1
Last Updated By : PUBLI H

COLOUR REFERENCES
Number of Colours used: 1

Black

EU513 Leaflet Label Inside pages

PAGE 3

245mm

127mm

Ne primjenjivati u usjevima pod stresom (od suše, mraza, stajanja vode, napada bolesti i/ili štetnika...), kao niti kada su noćne temperature niske ili se očekuje mraz.
Ne obrađivati tlo 7 dana prije i 7 dana nakon primjene sredstva.
Primjena iz zraka nije dopuštena.

Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti: Ponovljena uporaba sredstava na osnovi aktivnih tvari iz istih skupina ili onih koji imaju jednak mehanizam djelovanja na istim površinama tijekom više godina može uzrokovati razvijanje rezistentnosti kod osjetljivijih korovnih vrsta. Da bi se takav rizik smanjio preporučuje se, na istoj parceli, mijenjati ili miješati sredstva različitog mehanizma djelovanja te primjenjivati agrotehničke mjere.

Mogućnost miješanja i kompatibilnost s drugim sredstvima: O mogućnostima miješanja sredstva STARANE™ FORTE s drugim sredstvima raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji.

Mjere zaštite pri radu: Obvezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi. Prilikom rada ne jesti, piti niti pušiti. Spriječiti dodir s kožom i očima i udisanje izmaglice škropiva. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod primjene koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica. Tijelo štiti laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja sredstva, za zaštitu upotrijebiti gumenu pregaču, čvrstu obuću, zaštitne rukavice te vizir ili naočale koje dobro prijanjaju. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena osobna zaštitna sredstva.

Simptomi otrovanja: Ako se proguta mogu se javiti opći znakovi otrovanja: mučnina, povraćanje, proljev, opća slabost. Može nadražiti kožu, oči i dišne puteve i uzrokovati reakcije preosjetljivosti.

Prva pomoć: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti iz kontaminiranog područja na svjež zrak ili u dobro prozračeni prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu na etiketi. Nema specifičnog antidota (protuotrova). Liječenje je simptomatsko.

Dodir s očima: Ukloniti kontaktne leće. Odmah isprati oči blagim mlazom vode i nastaviti kroz najmanje 15 minuta tako da se čistim kažiprstom i palcem razmakne kapke. U slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika.

Gutanje: Ako je unesrećena osoba pri svijesti i spremna na suradnju treba joj isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje, odmah zatražiti pomoć liječnika. Osobi u nesvijesti ništa ne davati putem usta.

Dodir s kožom: Odstraniti onečišćenu odjeću i obuću, kožu odmah isprati s dovoljno vode i sapuna kroz najmanje 15 minuta. Ako se pojave znakovi nadraživanja ili alergijske reakcije zatražiti pomoć liječnika.

Udisanje izmaglice škropiva: Unesrećenu osobu izvesti iz onečišćenog područja, u slučaju pojave tegoba zatražiti pomoć liječnika.

Mjere zaštite okoliša: Kod primjene sredstva STARANE™ FORTE moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo STARANE™ FORTE ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i ne ciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi najmanje 1 metar.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvođe. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Način ispiranja ambalaže, postupanje s ostacima sredstva i praznom ambalažom: Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik prskalice, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe. Neupotrijebljeno sredstvo, ostatke sredstva i praznu ambalažu zbrinuti u skladu s propisima o gospodarenju otpadom.

Postupak čišćenja stroja za primjenu pesticida: Ostatke škropiva razrijeđene vodom u omjeru 1:10 potrebno je rasprskati na tretiranu površinu dok je uključena miješalica. Dobro isprati spremnik i isplahnuti cijevi i sapnice (dize) čistom vodom tri puta (trostruko ispiranje). Fizički ukloniti sve vidljive naslage. Ukloniti i očistiti sapnice (dize), zasune i filtre. Cijeli sistem isprati čistom vodom. Stroj za primjenu i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Mjere zaštite u slučaju nezgode:

1. *U slučaju nezgode u zatvorenom prostoru poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:*

- 1.1. Prije ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti filtarsku polumasku ili masku za zaštitu od čestica.
- 1.2. Različeno sredstvo posuti upijajućim materijalom (npr. pijesak, suha zemlja, piljevina) i temeljito pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga kontaminirane površine oprati vodom i deterdžentom i tekućinu također odložiti u spremnik s otpadnim sredstvom. U slučaju prolijevanja škropiva: ograditi prolivenu tekućinu branama, potom ju pokupiti u odgovarajući spremnik. Otpatke skupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike, koji se mogu čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i deterdžentima uz poštivanje propisa o zaštiti okoliša. Pokupljeni materijal predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.
- 1.3. Ako je prostor zahvatio požar, odmah treba započeti gašenje pjenom, suhim prahom ili s CO₂, uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za disanje s otvorenim ili zatvorenim krugom)
- 1.4. Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odjeću i zaštitna sredstva i oprati kožu vodom i sapunom.

2. *U slučaju nezgode na otvorenom osim gore navedenih poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:*

- 2.1. Ne dopustiti da dospije u dublje slojeve tla, postavljanjem pješčanih brana ili kopanjem kanalića. Ne ispuštati u kanalizaciju/ površinske vode/ podzemne vode.

3. *Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijevozu:*

- 3.1. Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatru i ne pušiti.
 - 3.2. Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.
 - 3.3. Uz obveznu uporabu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od neoštećene.
- U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili odvoda obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj 112. Za ostale potrebne informacije obratiti se vlasniku rješenja o registraciji.

Napomena korisniku: Proizvođač garantira visoku kvalitetu proizvoda ukoliko se primjenjuje u potpunosti u skladu s uputama za uporabu. Obzirom da nema utjecaja na skladištenje, rukovanje, miješanje niti opće uvjete praktične uporabe, proizvođač ne može biti odgovoran za nedjelotvornost, gubitak ili bilo koju drugu štetu zbog nepravilnog skladištenja, rukovanja, primjene ili pogrešne uporabe proizvoda. Proizvođač ne preuzima odgovornost za čimbenike koji su izvan njegovog utjecaja, kao što su skladištenje, prijevoz, način primjene i ostalo, a što može utjecati na kvalitetu sredstva.



Package MID : 97077742 2010
Trade Name : STARANE FORTE
Country : CROATIA
Size : 231MM X 127MM
Artwork Type : 1L BOOKLET LABEL
Specification : EU 513 PAGO
Standardisation Level : 8
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : N/A

Ticket No : N/A
Date : 28-OCT-20
Proof Cycle No : 1
Last Updated By : PUBLI H

COLOUR REFERENCES
Number of Colours used: 1

Black

EU513 Leaflet Label Last page (fixed on base label)

PAGE 4

231mm

127mm

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**

Package MID : 97077742 2010
Trade Name : STARANE FORTE
Country : CROATIA
Size : 231MM X 127MM
Artwork Type : 1L BOOKLET LABEL
Specification : EU 513 PAGO
Standardisation Level : 8
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : N/A

Ticket No : N/A
Date : 28-OCT-20
Proof Cycle No : 1
Last Updated By : PUBLI H

COLOUR REFERENCES
Number of Colours used: 4



EU513 Leaflet Label
Base label

PAGE 5

231mm
127mm

Starane™

FORTE

HERBICID

Koncentrat za emulziju (EC)
SADRŽI:
fluroksipir (fluroksipir-meptil) (4-amino-3,5-diklor-6- fluor-2-piridiloksiocetna kiselina), **333 g/L** (31,5 % w/w), što odgovara fluroksipir-meptil **480 g/L** (45,5 % w/w)
CAS br.: 69377-81-7 (fluroksipir)
CAS br.: 81406-37-3 (fluroksipir-meptil)
Ostale tvari: smjesa N,N-dimetildekan-1-amida i N,N-dimetiloktanamida <40 %
STARANE™ FORTE je sistemični herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u ratarstvu, povrčarstvu, aromatičnom bilju te usjevima za proizvodnju sjemena.
Mjere prve pomoći: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti iz kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu na etiketi. Nema specifičnog antidota (protuotrova). Liječenje je simptomatsko.

Upozorenje
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H335 Može nadražiti dišni sustav.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P261 Izbjegavati udisanje pare i aerosola.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo, zaštitu za oči i zaštitu za lice.
P302+P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode.
P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.
Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
P501 Odložiti sadržaj i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.
EUH401- Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake obavijesti:
SP 1: Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uredaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda.
Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.
SPa 1: Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo iz skupine sintetskih auksina više od jedanput godišnje na istoj površini.

SPe 2: Zbog zaštite podzemnih voda ne upotrebljavati na alkalnom tlu (pH > 7).
SPe 3: Zbog zaštite nećiljanog bilja treba poštivati zone sigurnosti od 5 metara do nepoljoprivredne površine.
SPo: Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica kod pripreme škropiva, rukovanja nerazrijeđenim sredstvom, kod primjene i rukovanja razrijeđenim sredstvom i škropivom.
SPo: Ulazak na tretiranu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva.

Prije uporabe sredstva obavezno pročitati uputu za uporabu.
Samo za profesionalne korisnike.
Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.
Primjena iz zraka nije dopuštena.
Dopuštena mjesta prodaje: Specijalizirane prodavaonice.

Skladištenje i čuvanje: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, u posebnoj prostoriji pod ključem zaštićen od sunčevih zraka i vlage, na prozračenom i suhom mjestu, na sobnoj temperaturi, odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Čuvati odvojeno od izvora paljenja – zabranjeno pušenje. Ne smije se prelijevati u drugu ambalažu, niti u posude iz kojih se jede ili pije ili u kojima se drže namirnice. Zaštititi sredstvo od mraza.
Datum proizvodnje i serijski broj otisnuti na ambalaži.

Rok uporabe: 2 godine
Registracijski broj sredstva: UP/I-320/20/17-03/362
Vlasnik rješenja o registraciji: Corteva Agriscience Croatia d.o.o., Ulica Florijana Andrašeca 18 A, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributer: CHROMOS AGRO d.d., Radnička cesta 173 n, Zagreb
™ ® Zaštitni znakovi tvrtke Corteva Agriscience i njenih povezanih tvrtki.

SADRŽAJ: 1 L

Corner of base label (shown red) is cut out to assist with booklet opening